

KLEINTIERORTHOPÄDIE
WIESBADEN



Berta-Cramer-Ring 34b | 65205 Wiesbaden | Tel.: 06122 - 535 730
E-Mail: kto.wiesbaden@anicura.de wiesbaden@anicura.de
anicura.de/wiesbaden

Kleintierorthopädie Wiesbaden GmbH | Berta-Cramer-Ring 34b | 65205 Wiesbaden

Herr
Dr. Michael Klein
Alt-Auringen 65
65207 Wiesbaden-Auringen

Wiesbaden den 28.03.2023

RÜCKÜBERWEISUNG

Sehr geehrter Herr Dr. Klein

Ich bedanke mich recht herzlich für die Überweisung des Patienten:

Patient: Emil, Schäferhund, männlich, * 12.01.2023

Halter: Herrn Markus Ebert, Märzgasse 7 in 97711 Maßbach

Diagnosen:

Fehlstellung hinten rechts

Hüftgelenksluxation

Knie- und Sprunggelenk steif

Operation:

Femurkopfhalsresektion rechts

Tarsus in Beugung fixiert (Fixateur externe)

Wundverschluß Monosyn. Wundpflaster.

Röntgenkontrolle postoperativ in zwei Ebenen.


Anästhesie:

Inhalationsnarkose mit Isofluran-Sauerstoff. Monitoring der Vitalfunktionen: Pulsoxymetrie, Kapnografie, Atemmonitor, Temperatur, EKG

Peripherer Venenkatheter und Dauertropfinfusion mit Vollektrolytlösung.

Medikamente perioperativ:

Ketamin Perfusor, Cefalexin i.v., Metapyrin i.v. Metacam, Propofol, Diazepam, Comfortan



KLEINTIERORTHOPÄDIE
WIESBADEN

Verordnete Medikamente:

1. NSAID, Start morgen, Dauer 2 Wochen (Schmerzmittel)
2. CefaTab 250mg: 2xtgl 0,75 Tabl, Start heute abend, Dauer 5 Tage (Antibiose)
3. Metamizol/Novalgin 500mg: bis zu 3xtgl 0,5 Tabl (Schmerzmittel bei Bedarf)

Belastungsplan:

ca 4 Wochen Leinenpflicht (ggf Boxenruhe).

Achten sie bei der täglichen Kontrolle der Naht auf Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung, Nässe etc.. Lecken an der Wunde muss unbedingt verhindert werden.

Röntgenkontrolle ca. 2 und 4 Wochen nach Operation sinnvoll, um den knöchernen Durchbau des Osteotomiespaltes und den Einbau des Implantates zu kontrollieren.

Bitte bei auftretenden Komplikationen oder Verschlechterung der Gliedmaßenbelastung umgehend bei uns melden.

Bericht, Hinweis:


- Die Hautnaht besteht aus resorbierbarem Nahtmaterial, das Entfernen der sichtbaren Knoten kann normalerweise nach 10-12 Tage postOP erfolgen.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.


Mit freundlichen Grüßen,

Tim Glück



KLEINTIERORTHOPÄDIE
WIESBADEN





KLEINTIERORTHOPÄDIE
WIESBADEN

